

TRAITEMENT DE LA GALE DUE À L'INFESTATION PAR SARCOPTES SCABIEI
ET DE LA TROMBIDIOSE AUTOMNALE (ROUGETS OU AOÛTATS)
À PARTIR DE 1 MOIS

ASCABIOL®

BENZOATE DE BENZYLE 10%

ÉMULSION POUR APPLICATION CUTANÉE

DE RETOUR contre la gale !

**NOUVELLE
POSOLOGIE**

**2
applications
à
8 jours
d'intervalle**

ASCABIOL®
10%
Benzoate de benzyle

**NOUVELLE
FORMULE**

Émulsion pour
application cutanée

Voie cutanée
Flacon de 125 ml



Zambon

**Nouvelle
formule**

Remboursé à **65%**
et agréé aux collectivités
dans le traitement
de la gale.

Non remboursé
et non agréé
aux collectivités
en cas de trombidiose
automnale.

Prix TTC 14,62 €



Zambon



ASCABIOL®

BENZOATE DE BENZYLE 10%

ÉMULSION POUR APPLICATION CUTANÉE

Posologie¹



	ADULTE ET ENFANT DE PLUS DE 2 ANS	FEMME ENCEINTE	ENFANT DE MOINS DE 2 ANS ET PLUS DE 1 MOIS
Étape 1	Prendre un bain ou une douche le soir et se sécher avec une serviette propre. Utiliser des vêtements et du linge de lit propres.		
Étape 2	Appliquer sur tout le corps sauf visage et muqueuses		
	2 couches à 10-15 min d'intervalle	1 couche	
Étape 3	Laisser agir 24h		Laisser agir 12h voire 6h chez les jeunes enfants
Étape 4	Prendre une douche après avoir laissé agir Ascabiol® et se rincer abondamment, se sécher avec une serviette propre. Utiliser des vêtements et du linge de lit propres.		
Étape 5	Recommencer 8 jours après		

Jour 0

Jour 1

1^{ère} application d'ASCABIOL®

Traitement du linge et de l'environnement



> Le matin suivant l'application d'ASCABIOL®,
procéder au nettoyage classique des locaux.



> En cas de **gale sévère** (gale profuse ou hyperkératosique)
désinfecter les matelas, les sommiers, la moquette et les autres mobiliers absorbants avec un acaricide.

Traitement de l'environnement¹



> **Lavage en machine à 60°C.**

> Pour les vêtements et le linge qui ne se lavent pas en machine, les **conserver dans un sac plastique fermé.**

Traitement des vêtements et du linge¹



3 heures
Avec **pulvérisation** d'un acaricide

OU



3 jours
Gale **commune**



8 jours
Gale **sévère**

Jour 8

2^{ème} application
d'ASCABIOL®

Jour 9

Traitement du linge
et de l'environnement

(1) Résumé des Caractéristiques du Produit.



ASCABIOL®

BENZOATE DE BENZYLE 10%

ÉMULSION POUR APPLICATION CUTANÉE


Pourquoi est-il important d'effectuer deux applications d'Ascabiol® en cas de gale ?

Le Haut Conseil de la Santé Publique recommande d'effectuer un second traitement une semaine après en cas de gale.

Cette recommandation s'appuie sur les constats suivants :

- Les différents produits utilisés par voie topique ou générale sont très probablement inefficaces sur les œufs et peut être les formes larvaires immatures
- Les taux de succès cliniques en cas de traitement unique sont insuffisants¹


> La gale est une maladie hautement contagieuse de la peau due à un acarien nommé Sarcopte. Au cours de sa vie, le Sarcopte passe par différents cycles parasitaires¹.



> La répétition du traitement à 8 jours d'intervalle permet de mieux prendre en compte le cycle de vie du Sarcopte et notamment des œufs pour éviter tout risque de réapparition de la gale.

Impact de la répétition d'une seconde application 8 jours après la première application en cas de gale

Cas N°1 1 seule application



Reproduction
du Sarcopte
possible

Échec du
traitement

Cas N°2 2 applications espacées de 8 jours



Éradication
du Sarcopte

Guérison

➤ Ainsi chez l'adulte de corpulence moyenne, la prescription et la délivrance de 2 flacons d'Ascabiol® sont nécessaires pour un traitement complet contre la gale.