

Tracrium[®] (bésilate d'atracurium)

> PRÉSENTATION

- ▶ Ampoules à 25 mg (2,5 mL), 50 mg (5 mL) et 250 mg (25 mL)

> INDICATIONS

- ▶ Induction et entretien d'une myorelaxation lors d'interventions chirurgicales, en association avec les anesthésiques
- ▶ Adaptation d'un patient au ventilateur

> POSOLOGIE

Adulte et enfant
de plus de 3 mois

- Induction : 0,3 à 0,6 mg /kg en IVL
- Entretien : de 0,3 à 0,5 mg/kg/h en IVSE

> DILUTION

Entretien



5 mL

+



45 mL NaCl 0,9 %

= 1 mg/mL

Posologie/Poids (kg)	10	20	30	40	50	60	70	80	90
0,3 mg/kg/h	3	6	9	12	15	18	21	24	27
0,5 mg/kg/h	5	10	15	20	25	30	35	40	45

> PROPRIÉTÉS

- ▶ Curare non dépolarisant

> CONTRE-INDICATIONS

- ▶ Antécédent d'hypersensibilité au Tracrium[®]
- ▶ Absence de matériel de ventilation
- ▶ Myasthénie
- ▶ Grossesse (1^{er} trimestre)